

Kliermaag Dilatie Syndroom virus

Papegaaiaachtigen kunnen er door worden aangetast. Hoewel men over de oorzaak nog in het duister tast, weten we in ieder geval wel dat het besmettelijk is. Na microscopisch onderzoek is aangetoond dat men in de richting van een virus moet zoeken. Er treden ontstekingen op in de hersenen en zenuwen van het maagdarmkanaal. In de maag en darmkanaal treden verlamingsverschijnselen in de wanden op. De maag en darmen nemen grotere vormen aan. De rek verdwijnt uit de darmen en gaan slecht functioneren. De zaden verteren niet meer en zijn nog heel in de besmettelijke ontlasting terug te vinden. Overlevingskansen zijn nihil. Men zal de vogels zacht voer moeten geven om de maag een kans te geven wat te krimpen, hij zal altijd een vergrote maag houden. Omdat we met een virus te maken hebben, kunnen ze ook drager blijven.

Preventie: Vogels aanschaffen uit een besmet milieu is zeer riskant. Goede hygiëne en ventilatie verhinderen vooral voor buiten gehuisveste vogels van een overdracht van dit virus. Hierbij mogen we ook niet vergeten dat U.V. licht "de zonnestralen" hier ook een desinfecterende werking heeft.

Recent heeft men wat vorderingen gemaakt, waarbij men bij levende vogels de aanwezigheid van het virus zou aan kunnen tonen. Een eventuele vaccinatie zal nog verder onderzoek nodig hebben. Dit syndroom is een ellende voor kweker en dierenarts.